

Nutrición especializada para personas con Enfermedad Renal Crónica en etapas 2, 3 y 4 no dializados

Relación
fósforo/proteína
4.5 mg/1 g¹

1,7
Kcal/mL

-3,8
PRAL⁶

328
mOsm/L

Sabor:
• Vainilla
Caramelo

Categoría Mipres: 1410

Libre de
sacarosa y
fructosa

Apto para
personas
con diabetes



Lata x 900 g - Lata x 378 g
1 porción
7 medidas (90g) en
180mL (1 vaso) de agua.

Unidosis sobre x 90 g
Diluir todo el contenido
del sobre (90g) en un
vaso (180mL) de agua.

Unidosis LPM x 90 g
Agregar agua potable hasta
la línea roja. Agitar y verificar
el volumen.

✓ **Con proteína de suero de leche:**
Mejor utilización proteica para menos desechos²

✓ **Menos fósforo con mejor calidad proteica**

✓ **Composición de grasas y nutrientes que
favorecen la salud cardiovascular³⁻⁴**

✓ **Libre de FODMAPs⁵**

Composición Nutricional

	1 Porción (90g)	%VCT
Proteína, g	10,5	10%
Proteína de suero		
Grasa, g	19	41%
Aceites de oliva y canola		
A. g. saturados, g	2,3	5%
A.g. monoinsaturados, g	13,3	29%
A.g. poliinsaturados, g	3,2	7%
A. linoléico (ω6), g	2,45	5,3%
A. linolénico (ω3), g	0,74	1,6%
Carbohidratos, g	50	49%
Maltodextrina		
Fibra dietaria, g	3,5	0%
Fibra de Avena		
Energía, Kcal	413	

	1 Porción (90g)	%RDA
Vitamina A, UI	595	23%
Vitamina D, UI	48	7%
Vitamina E, mg	143	953%
Vitamina K, µg	23	22%
Vitamina, C, mg	22	27%
Tiamina, mg	23	2000%
Riboflavina, mg	0,47	39%
Niacina, mg	3,78	25%
Piridoxina, mg	2,34	156%
Ácido fólico, µg	238	60%
Ácido pantoténico, mg	1,17	23%
Biotina, µg	7,11	24%
Vitamina B12, µg	119	4958%
Colina, mg	151	31%

	1 Porción (90g)	%RDA
Fósforo, mg	47,7	7%
Potasio, mg	276	6%
Sodio, mg	191	14%
Cloro, mg	196	10%
Calcio, mg	238	22%
Hierro, mg	4,77	37%
Magnesio, mg	71	19%
Manganeso, mg	0,55	27%
Zinc, mg	4,77	50%
Selenio, µg	23	42%
Cromo, µg	8,5	31%
Cobre, mg	0,25	28%
Yodo, µg	38	25%
Molibdeno, µg	31	69%
Inositol, mg	310	—

Nutrición especializada para personas en terapia de reemplazo renal

Relación
fósforo/proteína
11mg/1g¹

1,5
Kcal/mL

Baja carga ácida
2,5
PRAL⁶

304
mOsm/L

• Con proteína de suero de leche:

Mejor utilización proteica
para menos desechos²

• Menos fósforo con mejor calidad proteica

• Composición de grasas y nutrientes que favorecen la salud cardiovascular³⁻⁴

• Bajo en FODMAPs⁵



Categoría Mipres: 1409

**Libre de
sacarosa y
fructosa**

**Apto para
personas
con diabetes**

Lata x 336 g



1 porción
6 medidas (84 g) en 180 ml
(1 vaso) de agua.

Unidosis LPM x 84 g



Agregar agua potable hasta
la línea roja. Agitar y verificar
el volumen.

Unidosis sobre x 84 g



Diluir todo el contenido
del sobre (84 g) en un
vaso (180 ml) de agua.

Composición Nutricional

	1 Porción (84g)	%VCT
Proteína, g	19	21%
Proteína de suero		
Grasa, g	14	35%
Aceites de oliva y canola		
A. g. saturados, g	2,1	5%
A. g. monoinsaturados, g	9,4	24%
A. g. poliinsaturados, g	2,4	6%
A. linoléico (ω6), g	1,8	4,5%
A. linolénico (ω3), g	0,7	1,8%
Carbohidratos, g	39	43%
Maltodextrina		
Fibra dietaria, g	1,3	1%
Fructooligosacáridos		
Energía, Kcal	360	

	Porción (84g)	%RDA
Vitamina A, UI	1035	40%
Vitamina D, UI	26	4%
Vitamina E, mg	105	697%
Vitamina K, µg	32	31%
Vitamina C, mg	46	56%
Tiamina, mg	77	6696%
Riboflavina, mg	0,70	58%
Niacina, mg	11	72%
Piridoxina, mg	3	202%
Ácido fólico, µg	311	78%
Ácido pantoténico, mg	4,9	98%
Biotina, µg	129	431%
Vitamina B ₁₂ , µg	154	6426%
Colina mg	197	40%

	Porción (84g)	%RDA
Fósforo, mg	202	29%
Potasio, mg	303	6%
Sodio, mg	312	23%
Cloro, mg	229	11%
Calcio, mg	394	36%
Hierro, mg	7,7	59%
Magnesio, mg	93	25%
Manganeso, mg	1,6	80%
Zinc, mg	9,3	98%
Selenio, µg	62	113%
Cromo, µg	42	154%
Cobre, mg	0,7	78%
Yodo, µg	45	30%
Molibdeno, µg	58	129%
Inositol, mg	311	—
L-Carnitina, mg	187	—
Taurina, mg	47	—

Alimento para propósitos médicos especiales polimérico en polvo, hiperproteico e hipercalórico, a base de proteína de suero de leche con maltodextrina, aceites vegetales, vitaminas y minerales para dar soporte nutricional oral o por sonda a adultos en terapia de reemplazo renal con desnutrición proteico calórica moderada o severa, o desgaste proteico energético, y que no logran cubrir sus necesidades nutricionales o demandas metabólicas con una alimentación normal o modificada. Registro Sanitario Invima RSA-0011559-2021

Referencias: 1) National Kidney Foundation. Am J Kidney Dis. 2003;42(4 Suppl 3):S1-202. 2) Castellanos V, et al. Nutr Clin Pract. 2006;21(5):485-504. 3) Miller M, et al. Circulation. 2011;123:2292-333. 4) ESC/EAS. Eur Heart J. 2011;32(14):1769-818. 5) Barrett J, et al. J Parenter Enteral Nutr. 2009;33(1):21-6. 6) Osuna-Padilla IA, et al. Nefrología. 2019;39(4):343-354

El contenido del presente documento es propiedad de BOYDORR S.A.S. y no puede ser reproducido total ni parcialmente, por cualquier medio, sin la expresa autorización del mismo. El uso, reproducción o distribución de su contenido sin autorización previa y escrita por parte de BOYDORR S.A.S. queda terminantemente prohibida. www.boydorr.com
- Material dirigido al cuerpo médico.